



A legértékesebbnek az életben.



Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer újszülött kortól

HiPP ANTI-REFLUX

fokozott bukás
diétás ellátására



Tájékoztatás egészségügyi szakemberek számára.


* A Metafolin® a Merck KGaA, Darmstadt, Németország, bejegyzett védjegye.

** Euromonitor International, Health & Wellness 2025. kiadás, RSP árakon, VIA részesedések, 2024-es adatok alapján

 Goodwill

Gastro-oesophagealis reflux - gyakori jelenség csecsemőknél

A gastro-oesophagealis reflux (GOR) a gyomor tartalmának a nyelőcsőbe való visszaáramlása regurgitációval és hányással vagy regurgitáció és hányás nélkül.¹



* Ez a csecsemőknél tompa szögű, így könnyebben visszakerülhet az étel a nyelőcsőbe. Felnőtteknél hegyes szögű és a táplálék nehezebben regurgitál.

- 4 hónapos korban a csecsemők kétharmada legalább naponta egyszer bukik, 40%-uk pedig szinte minden étkezés után.²
- A fő ok a még éretlen alsó nyelőcső-záróizom.
- A legtöbb gyermeknél a reflux ártalmatlan és nem befolyásolja negatívan a fejlődésüket.³
- A reflux és a bukás ugyanakkor negatív hatással lehet a csecsemők és szüleik életminőségére⁴, ami sok esetben arra készteti a szülőket, hogy orvosi segítséget kérjenek.⁵

Egyes csecsemőknél a GOR zavaró tüneteket okoz, amelyek befolyásolják a mindennapi életvitelt és / vagy szövődményekhez vezetnek. Ilyen esetben gastro-oesophagealis reflux betegségről (GORD) van szó.¹ Gyermekorvosként fontos más betegségek kizárása.

Konzervatív módszerek a reflux kezelésére

Szoptatással táplált csecsemők esetében ^{1,6}	Tápszerrel táplált csecsemők esetében ¹
- szoptatás folytatása - szoptatási tanácsadás egy képzett szakemberrel - ha a csecsemő súlyos refluxban szenved, megfontolandó az anyatej sűrítése	- a tápszer sűrítése - kisebb mennyiségű, de gyakoribb etetés - túletetés elkerülése
Ha az állapot nem javul, megfontolandó olyan tápszer alkalmazása, amely extenzíven hidrolizált fehérjét (vagy aminosav-alapú összetevőket) tartalmaz. Szoptatott csecsemők esetében az édesanya megpróbálhat tejmentes étrendre váltani, mivel a reflux akár tehéntejfehérje-allergia tünete is lehet.	
A szülők megnyugtató, támogatása és tájékoztatása fontos szerepet játszik a GOR / GORD kezelésében.¹	

A sűrített tápszerek hatékonyan csökkentik a reflux előfordulását:

- A sűrítők használata javíthatja a csecsemőknél a GOR tüneteiként jelentkező regurgitáció / hányás előfordulását.¹
- A sűrített tápszerek csökkentik a bukás gyakoriságát és súlyosságát. Olyan tápszerrel táplált csecsemők számára ajánlottak, akiknél a tünetek a szülők megfelelő tájékoztatása és támogatása, illetve a megfelelő táplálékmenyiség biztosítása ellenére is fennállnak.⁷
- Az AR (anti-reflux) tápszerek javasolhatók, mivel elősegítik a reflux tüneteinek enyhítését.⁸

Hivatkozások:

1 Rosen RE et al. JPN. 2018;66:516–554.

2 Baird DC et al. Am Fam Physician. 2015;92(8):705–714.

3 Winter HS 2018. www.upToDate.com (letöltve: 2018.06.20).

4 Craig WR et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD003502.

5 Campanozzi A et al. Pediatrics. 2009;123:779–783.

6 NICE guideline NG12015. www.nice.org.uk/guidance/ng1 (letöltve: 2018.04.23).

7 Salvatore S et al. Nutrition. 2018 May;49:51–56.

8 Vandenplas Y et al. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19(3):153–161.

HiPP ANTI-REFLUX speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer újszülött kortól, szentjánoskenyérmag-liszttel

A születéstől fogva kizárólagos tápanyagforrásként, 6 hónapos kortól a vegyes étrend részeként.

- **Szentjánoskenyérmag-liszttel**, amely természetes sűrítőanyag
- **Természetes *L. fermentum* tejsavkultúrával**, amely az anyatejben is megtalálható**
- **Metafolin®-nal**

Miért előnyösebb AR tápszert használni, a hagyományos tápszerek sűrítése helyett?

- **Energiasűrűsége és tápanyag összetétele megegyezik a csecsemőtápszerével.**
- **Biztosítja a csecsemő tápanyagszükségletét anélkül, hogy túlzott energiabevitelt okozna. Ezzel szemben a külön alkalmazott sűrítőanyag nemkívánatos többletenergiát biztosít.**^{7,8}
- **Egyszerűen használható (hasonlóan a hagyományos csecsemőtápszerhez): az elkészítési hibák, mint például a túl sok sűrítőszer használata, kiküszöbölhető.**

^{**}Az anyatej nagy mennyiségű természetes tejsavkultúrát tartalmaz, amelyek egyénenként eltérőek lehetnek.



hcp.hipp.hu

Fontos információ: A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Kérjük, csak gyermekorvossal folytatott konzultációt követően, és csak addig használjon speciális gyógyászati célra szánt élelmiszert, ameddig a tünetek enyhítéséhez szükséges. A HiPP Anti-Reflux speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer csecsemők fokozott böfögésének és bukásának diétás ellátására szolgál, és csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható, a születéstől fogva kizárólagos tápanyagforrásként, 6 hónapos kortól pedig a vegyes étrend részeként. Tehéntejfehérje-allergia vagy annak gyanúja esetén nem használható csecsemők táplálására. A HiPP Anti-Reflux speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer használatával gyermeke tünetei néhány nap alatt javulnak. Amennyiben nem észlel javulást a tünetekben, kérjük ismételt forduljon gyermekorvosához. A készítmény az anyatejhez hasonlóan szénhidrátokat tartalmaz. A fogak szénhidráttartalmú folyadékokkal való gyakori vagy tartós érintkezése fogszuvadásához vezethet. Ne hagyja gyermekét a cumisüveget hosszan szopogatni. Parenterálisan nem alkalmazható.

HiPP Anti-Reflux speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer újszülött kortól. Bruttó fogyasztói ár: 4.341 Ft. Normatív támogatási összeg: 1.085 Ft. Térítési díj normatív támogatás esetén: 3.256 Ft. Közgyógyellátottaknak térítésmentesen rendelhetők. Forrás: www.neak.gov.hu. Publikus gyógyszertervezés (PUPHA), érvényesség kezdete: 2026. 02. 01.

A Hipp Kft. magyarországi kommunikációs partnere:



Goodwill Pharma Nyrt.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

HiPP/AL45385/26/02

Dokumentum lezárva: 2026.02.02.

Hipp Kft. 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 32.

info@hipp.hu hcp.hipp.hu

A Hipp Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért.