



A legértékesebbnek az életben.



Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer újszülött kortól

HiPP COMFORT

csecsemőkori puffadás,
laktóz okozta kólika és
székrekedés diétás ellátására




Tájékoztató egészségügyi szakemberek számára.

* A Metafolin® a Merck KGaA, Darmstadt, Németország, bejegyzett védjegye.

** Euromonitor International, Health & Wellness 2025. kiadás, RSP áron, VIA részesedések, 2024-es adatok alapján

 Goodwill

Minden második csecsemő nem specifikus emésztési problémáktól szenved¹



Róma IV diagnosztikai kritériumok⁴

Csecsemőkori kólika

- a tünetek megjelenése és megszűnése 5 hónapos kor előtt történik
- szülők által észlelt ismétlődő és elhúzódó sírás, nyugtalanság vagy ingerlékenység, amelynek nincs egyértelmű oka, valamint a szülők nem tudják megelőzni vagy megszüntetni
- nincs jele csecsemőkori fejlődési zavarnak, láznak vagy betegségnek

Funkcionális székrekedés

Legalább 1 hónapon keresztül, az alábbiak közül legalább 2 tünet fennállása csecsemőknél és 4 éves kor alatti gyermekeknél:

- hetente legfeljebb 2 székletürítés
- túlzott székletvisszatartás a kórtörténetben
- fájdalmas vagy nehéz székletürítés a kórtörténetben
- nagy átmérőjű széklet a kórtörténetben
- nagy mennyiségű széklet jelenléte a végbélben

Szobatiszta gyermekek esetében még további kritériumok alkalmazhatók:

- hetente legalább 1 inkontinencia epizód a szobatisztaság elsajátítása után
- nagy átmérőjű széklet előfordulása, amely akár el is dugíthatja a WC-t

Ajánlások a **csecsemőkori kólika** kezelésére vonatkozóan²

Szülők tájékoztatása és megnyugtatósa

- a sírás az éhség és a fáradtság jele
- nyugodt és rendszeres napi rutin
- az átmenetiség tudatosítása (3-4 hónap, kritikus időszak 4-6 hetes korban)
- a csecsemők megnyugtatósát szolgáló technikák, például a sírás közbeni ringatás, sokat segíthetnek
- bátorítani a szülőket a szoptatás folytatására, a saját testi-lelki jóllétük megőrzésére és szükség esetén a segítségkérésre

Táplálkozási intézkedések

- Ha nem áll fenn **tehéntejfehérje-allergia**, akkor a pre- és probiotikumokat tartalmazó, hidrolizált, alacsony laktóztartalmú tápszer csökkentheti a sírás időtartamát nem szoptatott csecsemőknél.

A gyógyszeres kezelés (például protonpumpa-gátlók, szimetikon) **nem hatékony** és mellékhatást okozhat.

Ajánlások a **székrekedés** kezelésére vonatkozóan²

Szülők tájékoztatása és megnyugtatósa

- információk a csecsemők normális székletürítéséről
- a szoptatott csecsemők ritkán szenvednek székrekedéstől, azonban előfordulhat, hogy egyes babáknál csak hetente egyszer van székletürítés

Táplálkozási intézkedések

- a szoptatás folytatása javasolt, majd 2–4 hét elteltével kontroll szükséges
- cumisüveges táplálás esetén fontos a tápszer helyes elkészítése
- egyes csecsemőknél a székrekedés oka lehet a tehéntejfehérje-allergia, azonban a székrekedés, mint a **tehéntejfehérje-allergia** egyetlen tünete, rendkívül ritka
- a nem szoptatott csecsemők számára előnyös lehet a hidrolizált fehérjét, prebiotikumokat és β -palmitinsavat tartalmazó tápszer

Székrekedés esetén a táplálkozási tanácsok és az étrendi javaslatok elégtelensége esetén fel nem szívódó hashajtók adása megfontolandó.

HIPP COMFORT speciális gyógyászati célra szánt ételkészítmény újszülött kortól

Csecsemőkori puffadás, laktóz okozta kólika és székrekedés diétás ellátására

A születéstől fogva kizárólagos tápanyagforrásként, 6 hónapos kortól a vegyes étrend részeként.

Speciális zsírszerkezet – magas β -palmitinsav tartalommal

- a β -palmitát a β -palmitinsav és a glicerín együttese
- az anyatejben a palmitátok 80% β -palmitinsav, míg a növényi zsírokban és tehéntejben ez az arány csak 40%, így a β -palmitinsav hatására jobb a kalciumfelszívódás és a csontanyagcsere

Csökkentett laktóztartalom

Hidrolizált fehérjével

Értékes ételmi rostokkal (GOS**)

Természetes *L. fermentum* tejsavkultúrával
amely az anyatejben is megtalálható***

Metafolin®-nal

*** laktózban nyert, gabona-olajosachárak

**** az anyatej nagy mennyiségű természetes tejsavkultúráját tartalmaz, amelyek egyénenként eltérőek lehetnek



Hivatkozások:

- 1 Vandenplas Y et al. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr* 2016;19(3): 153-61
- 2 Salvatore S et al. *Acta Paediatr* 2018; 107(9): 1512-1520
- 3 Camilleri M et al. *Neurogastroenterol Motil* 2013; 29
- 4 Benninga MA et al. *Gastroenterology* 2016; 150: 1443-55

hcp.hipp.hu

Fontos információ: A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Kérjük, csak gyermekorvossal folytatott konzultációt követően, és csak addig használjon speciális gyógyászati célra szánt ételkészítményt, ameddig a tünetek enyhítéséhez szükséges. A HIPP Comfort speciális gyógyászati célra szánt ételkészítmény a puffadás, a laktóz okozta kólika és a székrekedésdiétás ellátására szolgál csecsemőkorban, és csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható, a születéstől fogva kizárólagos tápanyagforrásként, 6 hónapos kortól pedig a vegyes étrend részeként. Tehéntejfehérje-allergia vagy annak gyanúja esetén nem használható csecsemők táplálására. A HIPP Comfort speciális gyógyászati célra szánt ételkészítmény használatával gyermeke tünetei néhány nap alatt javulnak. Amennyiben nem észlel javulást a tünetekben, kérjük ismét forduljon gyermekorvosához. A készítmény az anyatejhez hasonlóan szénhidrátokat tartalmaz. A fogak szénhidráttartalmú folyadékokkal való gyakori vagy tartós érintkezése fogszúvasodáshoz vezethet. Ne hagyja gyermekét a cumisüveget hosszan szopogatni. Parenterálisan nem alkalmazható.

HIPP Comfort speciális gyógyászati célra szánt ételkészítmény újszülött kortól. Bruttó fogyasztói ár: 6.131 Ft. Normatív támogatási összeg: 1.533 Ft. Térítési díj normatív támogatás esetén: 4.598 Ft. Közgyógyellátottaknak térítésmentesen rendelhetők. Forrás: www.neak.gov.hu. Publikus gyógyszertervező (PUPHA), érvényesség kezdete: 2026.02.01.

A Hipp Kft. magyarországi kommunikációs partnere:



Goodwill Pharma Nyrt.
6724 Szeged, Cserny Mihály u. 32.

HIPP/AL45386/26/02

Dokumentum lezárva: 2026.02.02.

Hipp Kft. 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 32.

info@hipp.hu hcp.hipp.hu

A Hipp Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért.